

Insecticida polivalente.

Protección segura

Capacidad

Composición	Etofenprox 28,75% p/v (287,5 g/l)
Formulación	(EC) - Concentrado emulsionable
Nº Registro	23333

CARACTERÍSTICAS

SHARK® es un insecticida de contacto e ingestión cuya materia activa está compuesta exclusivamente de carbono, hidrógeno y oxígeno.

Cultivo	Plaga	Condicionamiento específico	Dosis	Nº Máximo de aplicaciones por campaña (intervalo)	Tratamientos	Plazo de seguridad (días)
Cítricos	Mosca de la fruta (<i>Ceratitis capitata</i>) Trips	Pulverización normal con tractor	0,1% (100 cc por 100 litros de agua) Dosis máxima: 0,75 l/ha	1	-	7
		Pulverización cebo con gota gruesa por parcheo. Tratar los árboles en la zona orientada al sur, en mezcla con proteína hidrolizada.	0,1% (100 cc por 100 litros de agua) Dosis máxima 0,6 l/ha	4 (14 días)	Tratar los árboles en la zona orientada al sur, en mezcla con proteína hidrolizada.	
Caqui (exclusivamente <i>Diospyros kaki</i> /palosanto)	Mosca de la fruta (<i>Ceratitis capitata</i>)	Pulverización cebo con gota gruesa por parcheo. Tratar los árboles en la zona orientada al sur, en mezcla con proteína hidrolizada.	0,1% (100 cc por 100 litros de agua)	2 por periodo vegetativo	Tratar los árboles en la zona orientada al sur, en mezcla con proteína hidrolizada.	3
Olivo	Prays, polilla del olivo (<i>Prays oleae</i>) (generación antófaga)	Tratar preferentemente en los primeros estadios de desarrollo de la plaga.	0,015 - 0,025% (15 a 25 cc por 100 litros de agua) Dosis máxima: 0,125 l/ha	2 (10-60 días)	Tratar preferentemente en los primeros estadios de desarrollo de la plaga.	NP

NP: No procede